



Mogeton[®] WP

BRUGSOMRÅDE

Ukrudts- og algemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af mos, levermos og alger i planteskolekulturer (så- og prikledede samt containerkulturer) på friland og i væksthuse.

1,5 kg

VIRKEMIDDEL:

Quinoclamín 250 g/kg
Fyldestoffer 750 g/kg

Mogeton® WP

INDHOLD

Ukrudts- og algemiddel nr. 18-460

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Quinoclamin.....25 %

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønsket langtidsvirkning i vandmiljøet (R50/53).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Undgå indånding af sprøjetågen.

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsehandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af mos, levermos og alger i planteskolekulturer (så- og prikledede samt containerkulturer) på friland og i væksthuse.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må i planteskolekulturer på friland ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Fabr. nr: Se mærke på pakning.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende iritation af hud og øjne søges straks læge.

Indånding

Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden

Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.



Øjnene

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald gerne opkastninger. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

BRUGSANVISNING

Mogeton er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes til bekæmpelse af algevækst og levermos i planteskolekulturer på friland (så- og prikledede samt containerkulturer) og i væksthuse.

Mogeton bekæmper alger samt levermos i alle udviklingsstadier og forebygger nyvækst i lang tid efter behandling.

Anvendelse

Mogeton anvendes ved udsprøjtning. Det er vigtigt for at opnå god virkning, at der er fugtige forhold. Dvs. at gode virkningsbetingelser normalt vil være at finde i april/maj og august/september. Hvis der vandes, kan der sprøjtes i hele vækstsæsonen. Behandling bør ikke foretages i stærk solskin.

Mogeton er et blegrødt produkt. På lyse planter kan behandlingen derfor i en kort periode være synlig med denne farve. For at undgå pletter på planter, som skal sælges indenfor kort tid, kan planterne overbruses med en mindre mængde rent vand efter 1-2 dage.

Planteskolekulturer: I kulturer som nåletræer, cotoneaster, potentilla, stephanandra og snebær anvendes 1,5 kg Mogeton i mindst 100 l vand pr. 1000 m².

I andre kulturer end de nævnte, anbefales det at afprøve tålsomheden på nogle få planter i god tid inden den egentlige sprøjtning.

Der bør altid bruges en vandmængde, der giver god befugtning af overfladen.

Tilberedning

Mogeton opblandes i sprøjte med min. 1000 L vand pr/ha. Husk omrøring.

Opbevaring

Mogeton opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for fagligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

® = Reg. varemærke fra Agro-Kanesho Co., Ltd., Japan

Et pulverprodukt fra:

Bayer A/S
Bayer Environmental Science
Postbox 2090
2800 Kgs. Lyngby



Bayer Environmental Science
A Business Group of
Bayer CropScience