

Racumin® Pasta**Varningstext**

Farligt vid förtäring (R22).

Aktiv substans: Kumatetralyl 0,038 vikt- %

Användningsområde

Mot råttor. Betet får inte läggas ut så att barn, husdjur, fåglar och annat vilt kan komma åt det.

Endast för yrkesmässigt bruk. All annan användning är otillåten.

Allmänt

Racumin® Pasta är ett bete baserat på vegetabiliska oljor och är mycket attraktivt för råttor. Det är särskilt användbart i miljöer som avloppssystem, avfallsanläggningar, lagerhus och stallar, eftersom formuleringen står emot fukt och väta och inte möglar.

Racumin® Pasta innehåller Bitrex, bitterämne, för att undvika att t.ex. husdjur äter av betet.

Applicering

Racumin® Pasta är färdigt att läggas ut direkt. Placera betet på platser där råttorna uppehåller sig: Vid råtthål, långa råttornas stråk och vid födoplatser.

Använd alltid någon form av skyddad betesstation, så att betet enbart blir tillgängligt för råttor och möss och blir kvar på platsen. Placera 100 gram bete (en förpackning) i varje station. Kontrollera betesstationerna regelbundet och placera ut nytt bete tills konsumtionen upphör.

Kumatetralyl har antikoagulerande verkan och kräver upprepad förtäring, råttorna dör vanligen efter 3-5 dagar. Samla ihop överlevit bete och om möjligt döda djur efter sanering och destruera dem.

Lagras och förvaras avskilt från födoämnen och foder. Tvätta alltid händer och exponerad hud efter användning.

Undvik att röka, äta eller dricka då betet hanteras. Innehåller bitterämne, vilket gör betet oattraktivt för hundar och andra husdjur.

Obs!

Risk för förgiftning av fåglar och annat vilt. Samla om möjligt ihop överlevit medel samt döda djur efter saneringens slut och oskadliggör dem (Se avfallshantering).

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Förvaras åtskilt från livsmedel och fodermedel.

Första hjälpen

Vid misstanke om förgiftning kontakta läkare (veterinär) eller giftinformationscentralen (tel. 112).

Information till läkare och veterinär: Racumin® Pasta har antikoagulerande egenskaper. Vitamin K₁ är motgift.

Avfallshantering

Rester och spill oskadliggörs genom förbränning på förbränningsanläggning för farligt avfall. Döda djur oskadliggörs genom nedgrävning eller förbränning på förbränningsanläggning för farligt avfall.

Rengjort tomemballage hanteras som hushållsavfall.



Hälsoskadlig

Racumin® Pasta

Racumin® Pasta är en långsamt verkande rottegift med aktivt stoffet coumatetralyl. Lökkemaden är baserat på vegetabiliska oljer och är meget attraktiv for rotter.

Da formuleringen tåler fugt og væde, er Racumin® Pasta meget anvendelig i miljøer som afløbssystemer, møddinger, lagerrum og stalde.

For at undgå at f.eks. kæledyr æder af lökkemaden indeholder Racumin® Pasta et bitter smagsstof, Bitrex®.

Anvendelse

Racumin® Pasta er klar til brug og skal placeres på de steder hvor rotterne færdes og opholder sig, ved rottehuller og langs rottens gangstier. Anvend 100-200 gram pasta (1- 2 enheder) ved hver giftstation, afhængigt af antallet af rotter. En giftstation bør altid forblive på samme lokalitet, således Racumin® Pasta er tilgængelig for rotterne gennem hele behandlingen. Efter at have spist af giften gentagen gange, dør rotterne de efterfølgende dage.

Kontroller regelmæssigt giftstationerne og udlæg nu lökkemad sålænge der ædes af lökkemaden. Ved brug af mange giftstationer vil det være praktisk at nummerer disse.

Forsigtig

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse af rotter må kun foretages af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen samt af personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Foregår bekæmpelse på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.

Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvordan man forholder sig i tilfælde af forgiftning.

At hensyn til faren for sekundær forgiftning af ugler og andre rovfugle samt af rovdyr på triand skal døde gnavere eftersøges og så vidt muligt opsamles og bortkaffes i udlægningsperioden.

Brugsanvisningens doseringsbestemmelser må ikke overskides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.

Ved forgiftning: Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder et blod koagulationshæmmende stof, og at K₁-vitamin kan benyttes som modgift.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester kan bortkaffes med dagrenovationen.

Gnavermiddel, 18-394.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Coumatetralyl 0,0375%

Tillverkare: Bayer AG, D-52368 Leverkusen, Tyskland.

Importör: Bayer Environmental Science

Bayer AB

Postbox 13 - 245 21 Staffanstorp

Sverige

Batch-nr. og produktionsdato: Se neden for etiketten.

Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer A/S

Postbox 2090, 2800 Kgs. Lyngby.

Tlf. 45 23 50 00

Racumin Pasta - 50 x 100 g - SE - SE79364024A - ARTICLE 79292414



Bayer Environmental Science

A Business Operation of Bayer CropScience